

Mã đề: 107

Họ, tên thí sinh:

Số báo danh:

Câu 81: Theo lí thuyết, cơ thể có kiểu gen Aabb giảm phân tạo ra loại giao tử ab chiếm tỉ lệ

- A. 75%. B. 50%. C. 25%. D. 100%.

Câu 82: Trong quá trình dịch mã, phân tử tARN có chức năng

- A. làm khuôn cho quá trình dịch mã.
B. kết hợp với prôtêin tạo nên ribôxôm.
C. kết hợp với rARN tạo nên ribôxôm.
D. vận chuyển axit amin tới ribôxôm.

Câu 83: Đột biến nào sau đây thuộc dạng đột biến cấu trúc NST?

- A. Mát đoạn. B. Thể ba. C. Thể một. D. Tam bội.

Câu 84: Cần thực hiện biện pháp nào sau đây để bảo vệ và phát triển rừng bền vững?

- A. Phá rừng làm nương rẫy để cải tạo rừng đầu nguồn.
B. Trồng rừng và khai thác rừng theo quy định.
C. Tăng cường khai thác rừng nguyên sinh.
D. Không khai thác rừng.

Câu 85: Giống lúa “gạo vàng” có khả năng tổng hợp β-carôten trong hạt là thành tựu của

- A. nuôi cây hạt phán. B. công nghệ gen.
C. lai hữu tính. D. công nghệ tế bào.

Câu 86: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố tiến hóa nào sau đây có thể tạo ra các alen mới cho quần thể?

- A. Các yếu tố ngẫu nhiên. B. Đột biến.
C. Giao phối không ngẫu nhiên. D. Chọn lọc tự nhiên.

Câu 87: Thực vật nào sau đây thuộc nhóm thực vật C4?

- A. Mía. B. Xương rồng. C. Thanh long. D. Dứa.

Câu 88: Tảo giáp nở hoa gây độc cho cá, tôm sống trong cùng môi trường là ví dụ về quan hệ

- A. kí sinh. B. hội sinh.
C. cạnh tranh. D. úc ché - cảm nhiễm.

Câu 89: Động vật nào sau đây có quá trình trao đổi khí giữa cơ thể và môi trường thông qua hệ thống ống khí?

- A. Chuột. B. Châu chấu. C. Cá chép. D. Éch.

Câu 90: Khi nói về các nhân tố tiến hóa, phát biểu nào sau đây đúng?

- A. Giao phối không ngẫu nhiên làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể.
B. Các yếu tố ngẫu nhiên có thể loại bỏ hoàn toàn một alen có lợi ra khỏi quần thể.
C. Đột biến gen cung cấp nguồn nguyên liệu thứ cấp cho quá trình tiến hóa.
D. Di – nhập gen chỉ làm thay đổi tần số alen của quần thể có kích thước nhỏ.

Câu 91: Khi nói về chu trình sinh địa hóa, phát biểu nào sau đây *sai*?

- A. Cacbon đi vào chu trình cacbon dưới dạng cacbon điôxit (CO_2).
B. Chu trình sinh địa hóa là chu trình trao đổi các chất trong tự nhiên.
C. Không có hiện tượng vật chất lắng đọng trong chu trình sinh địa hóa.

D. Trong chu trình nitơ, thực vật hấp thụ nitơ dưới dạng NH_4^+ và NO_3^- .

Câu 92: Ở sinh vật nhân thực, côđon nào sau đây quy định tín hiệu kết thúc quá trình dịch mã?

- A.** 5'AGG3'. **B.** 5'AUG3'. **C.** 5'UGA3'. **D.** 5'AUA3'.

Câu 93: Các cây thông nhựa liền rễ sinh trưởng nhanh hơn và có khả năng chịu hạn tốt hơn các cây sống riêng lẻ. Đây là ví dụ về mối quan hệ

- A.** hội sinh. **B.** cộng sinh.
C. hợp tác. **D.** hỗ trợ cùng loài.

Câu 94: Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu gen phân li theo tỉ lệ 1 : 1?

- A.** AA x AA. **B.** Aa x Aa. **C.** Aa x aa. **D.** aa x aa.

Câu 95: Ở miền Bắc Việt Nam, năm nào có nhiệt độ môi trường xuống dưới 8°C thì năm đó có số lượng bò sát giảm mạnh. Đây là ví dụ về kiểu biến động số lượng cá thể

- A.** không theo chu kì. **B.** theo chu kì ngày đêm.
C. theo chu kì mùa. **D.** theo chu kì nhiều năm.

Câu 96: Trong quá trình tiến hóa, các tế bào sơ khai được hình thành trong giai đoạn nào sau đây?

- A.** Tiến hóa sinh học. **B.** Tiến hóa tiền sinh học.
C. Tiến hóa văn hóa. **D.** Tiến hóa hóa học.

Câu 97: Trong cơ chế điều hòa hoạt động của opéron Lac ở vi khuẩn *E.coli*, prôtêin nào sau đây được tổng hợp ngay cả khi môi trường không có lactôzo?

- A.** Prôtêin ức chế. **B.** Prôtêin Lac Z.
C. Prôtêin Lac Y. **D.** Prôtêin Lac A.

Câu 98: Ba loài thực vật có quan hệ họ hàng gần kí hiệu là loài A, loài B và loài C. Bộ NST của loài A là $2n = 24$, của loài B là $2n = 26$ và của loài C là $2n = 24$. Các cây lai giữa loài A và loài B được đa bội hóa tạo ra loài D. Các cây lai giữa loài C và loài D được đa bội hóa tạo ra loài E. Theo lí thuyết, bộ NST của loài E có bao nhiêu NST?

- A.** 50. **B.** 52. **C.** 76. **D.** 74.

Câu 99: Ở ruồi giấm, thực hiện phép lai P: $X^M X^m \times X^m Y$. Theo lí thuyết, F1 tối đa có bao nhiêu loại kiểu gen?

- A.** 4. **B.** 1. **C.** 3. **D.** 2.

Câu 100: Ở cây hoa phán (*Mirabilis jalapa*), gen quy định màu lá nằm trong tế bào chất. Lấy hạt phán của cây lá xanh thụ phấn cho cây lá đóm. Theo lí thuyết, đời con có tỉ lệ kiểu hình là

- A.** 3 cây lá xanh : 1 cây lá đóm. **B.** 100% lá đóm.
C. 100% lá xanh. **D.** 1 cây lá đóm : 1 cây lá xanh.

Câu 101: Xét 4 quần thể của cùng 1 loài cá sống ở 4 hồ tự nhiên, số lượng cá thể của mỗi nhóm tuổi thuộc mỗi quần thể được thể hiện trong bảng dưới đây:

Quần thể	Tuổi trước sinh sản	Tuổi đang sinh sản	Tuổi sau sinh sản
Số 1	348	284	162
Số 2	266	264	92
Số 3	96	192	54
Số 4	430	300	160

Phân tích bảng số liệu trên và cho biết kết luận nào sau đây đúng?

- A.** Quần thể số 4 có kích thước đang tăng lên.
B. Quần thể số 1 có kích thước nhỏ nhất.
C. Quần thể số 3 được khai thác ở mức phù hợp.
D. Quần thể số 2 có kích thước đang suy giảm.

Câu 102: Phát biểu nào sau đây đúng về hô hấp ở thực vật?

- A.** Quá trình phân giải kị khí không tạo ra ATP.
B. Nguyên liệu của quá trình hô hấp ở thực vật là CO_2 và H_2O .

C. Hô hấp sáng không tạo ra ATP.

D. Trong điều kiện thiếu ôxi, thực vật tăng cường quá trình hô hấp hiếu khí.

Câu 103: Tế bào vi khuẩn *E.coli* vốn mẫn cảm với chất kháng sinh tetracycline. Trong kỹ thuật chuyển gen vào vi khuẩn này người ta dùng plasmid có gen kháng chất trên. Người ta tạo ra ADN tái tổ hợp có chứa gen kháng chất kháng sinh trên và chuyển chúng vào tế bào nhận. Để nhận biết tế bào vi khuẩn đã nhận ADN tái tổ hợp hoặc chưa nhận thì người ta nuôi cấy các vi khuẩn trên trong môi trường nào sau đây sẽ có hiệu quả nhận biết nhất?

A. Môi trường nuôi cấy bổ sung tetracycline.

B. Môi trường có gen phát sáng.

C. Môi trường nuôi cấy khuyết tetracycline.

D. Môi trường có insulin.

Câu 104: Một quần thể ngẫu phôi có thành phần kiểu gen là 0,4Aa : 0,6aa. Theo lí thuyết, tần số alen a của quần thể này là bao nhiêu?

A. 0,6.

B. 0,2.

C. 0,4.

D. 0,8.

Câu 105: Khi nói về tiêu hóa ở động vật, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Ở thủy tucus, thức ăn chỉ được tiêu hóa nội bào.

B. Ở thú ăn thịt, một phần thức ăn được tiêu hóa ở manh tràng.

C. Ở người, thức ăn được tiêu hóa trong túi tiêu hóa.

D. Ở động vật nhai lại, dạ dày khé có khả năng tiết ra enzym pepsin và HCl.

Câu 106: Khi nói về quá trình hình thành loài mới bằng con đường cách li địa lý, phát biểu nào sau đây sai?

A. Quá trình hình thành loài mới bằng con đường cách li địa lý thường xảy ra chậm chạp, qua nhiều giai đoạn trung gian chuyển tiếp.

B. Vốn gen của quần thể có thể thay đổi nhanh hơn nếu có tác động của các yếu tố ngẫu nhiên.

C. Cách li địa lý là nguyên nhân trực tiếp gây ra biến đổi tương ứng trên cơ thể sinh vật.

D. Quá trình hình thành loài mới bằng con đường cách li địa lý thường xảy ra đối với các loài động vật có khả năng phát tán mạnh.

Câu 107: Một loài sinh vật có bộ NST $2n = 24$. Theo lí thuyết, thế ba phát sinh từ loài này có số lượng NST trong tế bào sinh dưỡng là bao nhiêu?

A. 23.

B. 36.

C. 25.

D. 13.

Câu 108: Cho các giai đoạn chính trong quá trình diễn tiến sinh thái ở một đầm nước nông như sau:

(1) Đầm nước nông có nhiều loài sinh vật thủy sinh ở các tầng nước khác nhau: Một số loài tảo, thực vật có hoa sống trên mặt nước, tôm, cá, cua, ốc,...

(2) Hình thành rừng cây bụi và cây gỗ.

(3) Các chất lỏng đọng tích tụ ở đáy làm cho đầm bị nồng đậm. Thành phần sinh vật thay đổi, các sinh vật thuỷ sinh ít dần, các sinh vật trên cạn xuất hiện tăng dần.

(4) Đầm nước nông biến đổi thành vùng đất trũng, cỏ và cây bụi chiếm ưu thế.

Trật tự đúng của các giai đoạn trong quá trình diễn tiến ở đầm nước là

A. (2)→(1)→(4)→(3).

B. (1)→(3)→(4)→(2).

C. (3)→(4)→(2)→(1).

D. (1)→(2)→(3)→(4).

Câu 109: Một loài thực vật, biết rằng mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn. Các gen liên kết hoàn toàn. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1:1:1:1?


A. $\frac{AB}{ab} \times \frac{Ab}{ab}$.

B. $\frac{aB}{ab} \times \frac{ab}{ab}$.

C. $\frac{Ab}{ab} \times \frac{aB}{ab}$.

D. $\frac{Ab}{ab} \times \frac{aB}{aB}$.

Câu 110: Giả sử lối thức ăn trong một hệ sinh thái được mô tả ở hình sau:



Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây đúng?

- A. Rắn có thể là sinh vật tiêu thụ bậc 2 hoặc là sinh vật tiêu thụ bậc 3.
- B. Nếu số lượng châu chấu giảm thì số lượng chuột giảm.
- C. Chuỗi thức ăn dài nhất có 4 mắt xích.
- D. Éch thuộc bậc dinh dưỡng cấp 2.

Câu 111: Ở 1 hệ sinh thái có 2 loài sên biển X và Y là động vật ăn tảo cùng sinh sống. Một thí nghiệm được tiến hành để tìm hiểu tác động của mật độ sên biển lên khả năng sinh trưởng của chúng và mật độ của tảo. Số liệu được trình bày như hình bên.

Khi nói về hệ sinh thái trên, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

- I. Ở khoảng thời gian 1, loài X có khả năng sinh trưởng kém hơn loài Y.
- II. Tốc độ sinh trưởng của loài Y giảm nhanh hơn so với loài X theo thời gian.
- III. Loài Y có ưu thế cạnh tranh cao hơn loài X khi nguồn thức ăn trong môi trường suy giảm.
- IV. Khi nguồn sống càng giảm, loài X có khả năng sinh trưởng giảm nhưng ưu thế cạnh tranh lại tăng.

A. 2.

B. 1.

C. 4.

D. 3.

Câu 112: Một quần thể ngẫu phối có tần số kiểu gen là 0,25 AA : 0,50 Aa : 0,25 aa. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

- I. Nếu không có tác động của các nhân tố tiến hóa thì F₂ có 60% số cá thể mang alen a.
- II. Nếu chỉ có tác động của nhân tố đột biến thì chắc chắn làm giảm đa dạng di truyền của quần thể.
- III. Nếu có tác động của các yếu tố ngẫu nhiên thì alen A có thể bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể.
- IV. Nếu chỉ có tác động của di - nhập gen thì tần số các alen luôn thay đổi theo một hướng xác định.

A. 2.

B. 3.

C. 1.

D. 4.

Câu 113: Cho biết các côdon mã hóa một số loại axit amin như sau:

Côdon	5'GUA3'; 5'GUX3'	5'UAU3'; 5'UAX3'	5'GAA3'; 5'GAG3'	5'GAU3'; 5'GAX3'
Axit amin	Valin	Tirôzin	Axit glutamic	Axit Aspartic

Một đoạn mạch làm khuôn tổng hợp mARN của alen M có trình tự nuclêôtít là:

Alen M: 3'TAX XAT ATG XAG XTT...ATX5'.

Alen M bị đột biến điểm tạo ra 4 alen có trình tự nuclêôtít ở đoạn mạch này như sau:

- I. Alen M₁: 3'TAX XAT ATA XAG XTT...ATX5'.
- II. Alen M₂: 3'TAX XTT ATG XAG XTT...ATX5'.
- III. Alen M₃: 3'TAX XAT ATG XTG XTT...ATX5'.
- IV. Alen M₄: 3'TAX XAT ATG XAG XTA...ATX5'.

Theo lí thuyết, trong 4 alen trên, có bao nhiêu alen mã hóa chuỗi polipeptit có thành phần axit amin bị thay đổi so với chuỗi polipeptit do alen M mã hóa?

A. 1.

B. 2.

C. 4.

D. 3.

Câu 114: Một loài thực vật giao phấn ngẫu nhiên có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội là $2n = 6$. Xét 3 cặp gen A, a; B, b; D, d nằm trên 3 cặp nhiễm sắc thể, mỗi gen quy định một tính trạng và các alen trội là trội hoàn toàn. Giả sử do đột biến, trong loài đã xuất hiện các dạng thể ba tương ứng với các cặp nhiễm sắc thể và các thể này đều có sức sống và khả năng sinh sản. Cho biết không xảy ra các dạng đột biến khác.

Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

- I. Ở loài này có tối đa 42 loại kiểu gen.
- II. Ở loài này, các cây mang kiểu hình trội về cả ba tính trạng có tối đa 20 loại kiểu gen.
- III. Ở loài này, các thể ba có tối đa 21 loại kiểu gen.
- IV. Ở loài này, các cây mang kiểu hình lặn về 1 trong 3 tính trạng có tối đa 10 loại kiểu gen.

A. 2.

B. 4.

C. 3.

D. 1.

Câu 115: Một quần thể tự thụ phấn, thế hệ xuất phát (P) có tần số allele gen: $0,1AABb : 0,4AaBb : 0,2Aabb : 0,2aaBb : 0,1aabb$. Biết rằng hai cặp gen Aa và Bb tương tác bổ sung, trong đó A và B quy định hoa đỏ; kiểu gen chỉ có 1 alen trội A hoặc B quy định hoa vàng, kiểu gen aabb quy định hoa trắng. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

- I. Nếu không có tác động của các nhân tố làm thay đổi tần số alen thì tần số alen A của quần thể P là 0,4.
- II. Giả sử ở quần thể P xảy ra đột biến gen thì tần số alen có thể không bị thay đổi.

III. Nếu quần thể P không chịu tác động của nhân tố làm thay đổi tần số alen thì ở F_2 tần số hoa đỏ là $\frac{7}{32}$.

IV. Loại bỏ hoàn toàn hoa trắng của quần thể P thì tần số hoa trắng ở thế hệ tiếp theo là $\frac{5}{36}$.


A. 4.

B. 3.

C. 1

D. 2.

Câu 116: Cho sơ đồ phả hệ sau:



Biết rằng hai cặp gen quy định hai tính trạng nói trên phân li độc lập. Bệnh hói đầu do alen trội H nằm trên NST thường quy định, kiểu gen dị hợp Hh biểu hiện hói đầu ở người nam và không hói đầu ở người nữ, quần thể này ở trạng thái cân bằng và có tần số người bị hói đầu là 40%. Xác suất để cặp vợ chồng số 10 và 11 sinh ra một đứa con trai không hói đầu và không bị bệnh P là

A. $\frac{27}{160}$.

B. $\frac{1287}{1440}$.

C. $\frac{133}{160}$.

D. $\frac{153}{1440}$.

Câu 117: Ở vi khuẩn *E.coli* kiểu đại, sự biểu hiện của gen *lac Z* (mã hóa β-galactozidaza), gen *lac Y* (mã hóa permase) thuộc opéron Lac phụ thuộc vào sự có mặt của lactozơ trong môi trường nuôi cấy. Bằng kỹ thuật gây đột biến nhân tạo, người ta đã tạo ra được các chủng vi khuẩn khác nhau và được nuôi cấy trong hai môi trường: không có lactozơ và có lactozơ. Sự biểu hiện gen của các chủng vi khuẩn được thể hiện ở bảng 1.

Bảng 1. Sự biểu hiện gen của các chủng vi khuẩn *E.coli*

Chủng vi khuẩn	Môi trường không có lactozơ		Môi trường có lactozơ	
	β-galactozidaza	permase	β-galactozidaza	permase
A	-	-	+	+
B	-	-	-	+
C	-	-	-	-

D	+	+	+	+
---	---	---	---	---

Dựa vào kết quả, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

- I. Chủng A là chủng vi khuẩn *E.coli* đột biến.
- II. Chủng *E.coli* kiêu dại bị đột biến ở gen *lac Z* tạo ra chủng B.
- III. Chủng C tạo ra do đột biến ở vùng khởi động hoặc đột biến ở cả gen *lac Z* và gen *lac Y* của chủng *E.coli* kiêu dại.
- IV. Chủng D tạo ra do đột biến ở gen điều hòa hoặc đột biến ở vùng vận hành của chủng *E.coli* kiêu dại.

A. 4.

B. 2.

C. 1.

D. 3.

Câu 118: Ở ruồi giấm, alen B quy định thân xám, alen b quy định thân đen; alen *V* quy định cánh dài, alen *v* quy định cánh ngắn. Các gen nằm trên NST thường. Cho lai giữa dòng thuần chủng thân xám, cánh dài với dòng thuần chủng thân đen, cánh ngắn, F₁ thu được 100% cá thể thân xám, cánh dài. Cho các cá thể F₁ giao phối ngẫu nhiên với nhau, F₂ thu được tỉ lệ: 70% thân xám, cánh dài : 5% thân xám, cánh ngắn : 5% thân đen, cánh dài : 20% thân đen, cánh ngắn. Biết rằng hoán vị gen (nếu có) thì chỉ xảy ra ở giới cái. Theo lý thuyết, phát biểu nào sau đây *sai*?


A. Đã xảy ra hoán vị gen với tần số 20%.

B. Các cá thể F₁ có kiểu gen $\frac{BV}{bv}$.

C. Ở F₂, tỉ lệ kiểu gen dị hợp về 2 gen là 20%.

D. Thân xám, cánh dài là các tính trạng trội.

Câu 119: Ở một loài hoa, xét ba cặp gen phân ly độc lập, các gen này quy định các enzym khác nhau cùng tham gia vào một chuỗi phản ứng hóa sinh để tạo nên sắc tố ở cánh hoa theo sơ đồ sau:



Các alen lặn đột biến a,b,d đều không tạo ra được các enzym A, B và D tương ứng. Khi các sắc tố không được hình thành thì hoa có màu trắng. Cho cây hoa đỏ đồng hợp tử về cả ba cặp gen giao phấn với cây hoa trắng đồng hợp tử về ba cặp gen lặn, thu được F₁. Cho các cây F₁ giao phấn với nhau, thu được F₂. Biết rằng không xảy ra đột biến, theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Ở F₂ có 8 kiểu gen quy định kiểu hình hoa đó.

II. Trong tổng hợp số cây thu được ở F₂, số cây hoa trắng chiếm tỉ lệ $\frac{7}{16}$.

III. Số kiểu gen tối đa của cây hoa trắng là 17.

IV. Nếu cho tất cả các cây hoa vàng ở F₂ giao phấn ngẫu nhiên, tỉ lệ hoa đỏ thu được ở F₃ là 0%.

A. 2.

B. 1.

C. 3.

D. 4.

Câu 120: Ở một loài thú, tiến hành phép lai P: ♀ $\frac{AB}{ab} X^D X^d \times ♂ \frac{AB}{ab} X^D Y$, thu được F₁. Trong tổng số cá thể F₁, có 16,5% số cá thể đực có kiểu hình trội về cả ba tính trạng. Biết mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội hoàn toàn, không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen ở cả quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái với tần số bằng nhau. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu dưới đây đúng?

I. F₁ có 40 loại kiểu gen.

II. Khoảng cách giữa gen A và gen B là 40cM.

III. F₁ có 8,5% so cá thể cái dị hợp tử về 3 cặp gen.

IV. F₁ có 28% số cá thể có kiểu hình trội về 2 tính trạng.

A. 3.

B. 2.

C. 1.

D. 4.

----- HẾT -----